

MATERIAL COMPLEMENTAR

FATORES QUE INFLUENCIAM O GRAU DE DIFICULDADE DE UMA EXTRAÇÃO DE TERCEIROS MOLARES

A **inclusão dentária** é uma característica que está muitas vezes associada aos terceiros molares, tendo assim, frequentemente, limitações associadas à falta de espaço disponível para a sua normo-erupção, ficando retidos por tecidos duros, tecidos moles, ou por ambos.

Além disso existem vários tipos de inclusão como podemos ver a seguir:

Inclusão óssea

É caracterizada pela inclusão completa do dente no interior do tecido ósseo, que o cerca de todos os lados.

• **Inclusão submucosa**

Ocorre quando um dente perfura a cortical óssea porém permanece incluso e coberto com mucosa

Semi-incluso

Ocorre quando um dente se comunica com a cavidade oral, porém não atinge a erupção completa



MATERIAL COMPLEMENTAR

Sendo assim, alguns fatores podem tornar a cirurgia dos terceiros molares impactados mais difícil ou menos difícil. E é isso que traremos na tabela a seguir:

Fatores que tornam as exodontias mais fáceis	Fatores que tornam as exodontias mais difíceis
Posição mesioangular	Posição distoangular
Classe 1A de Pell e Gregory	Classe 3C de Pell e Gregory
Raízes cônicas fusionadas	Raízes divergentes
Impacção em tecido mole	Impacção óssea completa
Separação do segundo molar	Proximidade com o segundo molar
Separação do nervo alveolar inferior	Proximidade com o nervo alveolar inferior
Ligamento periodontal amplo	Ligamento periodontal estreito
Folículo grande	Folículo pequeno
Osso elástico	Densidade óssea aumentada
Um ou dois terços de raízes formadas	Raízes longas e finas

Fonte:

- Livro preparatório buco-maxilo-facial 2020
- ANTUNES, Hugo Daniel Aguiar. Complicações associadas a extração de terceiros molares inclusos. Universidade Fernando Pessoa, 2014.

